

Bonimed Regulobon Ojca Grzegorza 200 G

cena: 38,17 PLN



Opis słownikowy

Producent	BONIMED
Wysyłka	1-3 dni

Opis produktu

BONIMED REGULOBON OJCA GRZEGORZA 200G

Suplement diety Łupina nasienna babki jajowatej i błonnik z nasion owsa, wchodzące w skład preparatu, wspomagają pracę jelit i wypróżnianie. Błonnik, inulina i bakterie probiotyczne, zawarte w Regulobonie, przyczyniają się do zachowania prawidłowego składu flory bakteryjnej jelit, co ma znaczenie w przypadku antybiotykoterapii oraz stosowania leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Zdrowa mikroflora jelitowa wspomaga naturalną odporność organizmu oraz sprzyja utrzymaniu właściwej masy ciała

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu 15g zawiera: Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu 15 g zawiera: Łupina nasienna babki jajowatej 8 g Błonnik z nasion owsa 4 g Inulina 2,99 g Mikrokapsułkowane kultury bakterii probiotycznych: 1x10⁹ CFU* Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus (* CFU - jednostki tworzące kolonie)

Składniki

łupina nasienna babki jajowatej (Plantago ovata), błonnik z nasion owsa, inulina, mikrokapsułkowane kultury bakterii probiotycznych: Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Zdrowy styl życia w tym zrównoważony sposób żywienia stanowią podstawę w zachowaniu dobrego stanu zdrowia

Ważne informacje

Przeciwwskazany u osób uczulonych na składniki preparatu. W przypadku stosowania innych leków należy je przyjmować 1 godzinę przed lub 2 godziny po spożyciu Regulobonu

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: W celu redukcji masy ciała i w czasie antybiotykoterapii spożywać 2-3 razy dziennie po 1 czubatej łyżeczce (5 g) przed jedzeniem. W celu ułatwienia wypróżnienia spożywać 2-3 łyżeczki jednorazowo. Przed użyciem silnie wstrząsnąć. Preparat dodać do ok. 200 ml soku, jogurtu lub wody. W przypadku stosowania leków należy je przyjmować godzinę przed lub 2 godziny po spożyciu Regulobonu

Masa netto: 200g