


FruitsMax 1000 mg, 60 tabletek

cena: 79,90 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	suplement diety
Postać	tabletki
Producent	invex remedies
Wysyłka	1-3 dni, 24 godziny

Opis produktu

Fruit Max to kompozycja 21 składników roślinnych oraz bakterii *Lactobacillus acidophilus* Er-2 szczep 317/402 Narine.

Składniki:

liofilizowana morela,
Lactobacillus acidophilus Er-2 szczep 317/402 Narine,
liofilizowana brzoskwinia,
liofilizowana truskawka,
liofilizowana malina,
liofilizowana czarna porzeczka,
liofilizowane jabłko,
liofilizowana hurma,
liofilizowany banan,
liofilizowana czarna śliwka,
liofilizowana gruszka,
liofilizowana jeżyna,
liofilizowana pomarańcza chińska (aspelin),
liofilizowana biała śliwka,
liofilizowany dereń,
liofilizowana pigwa,
liofilizowany ananas,
liofilizowany rokitnik,
liofilizowane czarne winogrono,
liofilizowane białe winogrono,
liofilizowany melon,
liofilizowany pomidor,
celuloza mikrokrystaliczna MCC101.

Sposób użycia:

Zalecana porcja dzienna:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletkę 2 razy dziennie,

Dzieci w wieku od 3 do 12 lat: 1 tabletkę 1 raz dziennie.

Zaleca się trzymać tabletkę w ustach przez kilka minut, a następnie przeżuć. W przypadku dzieci poniżej 6 roku życia zaleca się zmielić tabletkę przed spożyciem. Tabletki Fruit Max należy przyjmować przed posiłkami.

Dla optymalnego efektu zaleca się przyjmować przez 5-6 tygodni.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu w temperaturze nie wyższej niż +10 °C w sposób niedostępny dla małych dzieci. Na czas transportu może być przechowywany w temperaturze otoczenia.

Ważne informacje:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Nie spożywać przy nadwrażliwości na składniki produktu.

Podmiot odpowiedzialny:

REMEDIIUM ZDROWIA I URODY

15-668 BIAŁYSTOK

UL. UPALNA 7 lok 2

Warunki ostrożności i przechowywanie

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Kobiety w ciąży oraz matki karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.