


## TEST C1 - test antygenowy z moczu wykrywający zakażenie Candida albicans



cena: 56,20 PLN

### Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	Farmabol
Wysyłka	1-2 dni

### Opis produktu

## TEST C1 - test antygenowy z moczu wykrywający zakażenie Candida albicans

Szybki test antygenowy na Candida Albicans do samodzielnego wykonania w domu.

Materiał badawczy stanowi próbka moczu. Najwyższe stężenie Candida Albicans występuje o poranku, dlatego w celu zwiększenia dokładności testu zaleca się jego wykonanie z próbki moczu porannego.

Zasada działania testu polega na jakościowym wykryciu antygeny w próbce moczu i jego wizualnym odczycie na urządzeniu kasetkowym.

Test C1 należy do grupy testów szybkich. Wynik uzyskujemy w ciągu 15 minut.

### Ważne:

Nie zaleca się odczytywać wynik po upływie 30 minut, gdyż pod wpływem wilgoci wynik testu może ulec zmianie.

Opakowanie zawiera pełny zestaw do przeprowadzenia jednego testu:

urządzenie testujące – kasetka, zakraplacz, miseczkę na mocz, probówkę ekstrakcyjną z buforem, instrukcję w języku polskim.

Opakowanie opisane w języku polskim.

### Candida albicans, czyli bielnik biały to grzyb pasożytniczy naturalnie zasiedlający ludzki

organizm. Przyjmuje się, że 80% ludzi jest nosicielem candida. W warunkach normalnych, gdy układ odpornościowy nosiciela działa bez zarzutów, candida albicans nie daje żadnych objawów, ani nie wywołuje żadnych stanów chorobowych.

Jednak w sytuacji osłabienia organizmu, spadku odporności może się nadmiernie namnażać i powodować infekcje grzybicze określane mianem kandydozy lub drożdżycy.

Drożdżycza atakuje głównie układ moczowo-płciowy. Jest również najczęstszą przyczyną infekcji dróg śluzowych przewodu pokarmowego i jelit.

W najcięższych przypadkach może dojść do zakażenia krwi przez żywe grzyby, czyli do fungemii.

Objawy zakażenia są właściwe dla grzybicy: świąd, zaczerwienienie błon śluzowych, podrażnienie, pieczenie, pęcherzyki ropne, ból. Zakażenie dotyczy kobiet, mężczyzn i dzieci, u których jest przyczyną zapalenia ucha oraz tak zwanego pieluszkowego zapalenia skóry.

Do zakażenia kandydozą dochodzi w przypadku: długiej antybiotykoterapii, osłabienia odporności, w wyniku przemęczenia, stresu, cukrzycy, podczas ciąży, w czasie terapii hormonalnej, w przebiegu chorób osłabiających układ odpornościowy np. AIDS, w trakcie zabiegów inwazyjnych, w przypadku stosowania cewników, sztucznych zastawek.

Badać powinny się kobiety w ciąży, przed porodem, oraz wszyscy, niezależnie od płci, podejrzewający zagrzybenie organizmu.

## Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Podmiot odpowiedzialny:

FARMABOL Sp. z o.o.  
ul. T. Ociepki 4  
34-600 Limanowa

## Galeria

