

## TEST T1 - test antygenowy z moczu wykrywający rzesistka pochwowego



cena: 56,20 PLN

### Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	Farmabol
Wysyłka	1-2 dni

### Opis produktu

## TEST T1 - test antygenowy z moczu wykrywający rzesistka pochwowego

Test antygenowy do samodzielnego wykonania w domu w kierunku zakażenia *Trichomonas vaginalis*, czyli rzesistkiem pochwowym. Materiał badawczy stanowi próbka moczu. Zaleca się poranny pobór materiału, kiedy stężenie rzesistka jest największe.

Zasada działania testu polega na określeniu jakościowym antygenu rzesistka pochwowego w próbce materiału badawczego i jego wizualnym przedstawieniu na urządzeniu kasetkowym.

Test należy do grupy testów szybkich, w których wynik otrzymujemy w przeciągu 15minut.

Nie należy odczytywać wynik po upływie 30 minut, gdyż pod wpływem wilgoci wynik może ulec zmianie.

Opakowanie zawiera pełny zestaw do jednorazowego przeprowadzenia testu: urządzenie testujące, zakraplacz, miseczkę na mocz, probówkę ekstrakcyjną z buforem.

Instrukcja wykonania testu i opakowanie opisane są w języku polskim.

Źródłem zakażenia są nosiciele, którzy w większości przypadków nie mają żadnych objawów ani dolegliwości. Nosiciele nie podejrzewając u siebie zarażenia, nie wykonują badań, nie leczą się i tym samym nie są świadomi płynącego od nich zagrożenia.

Zakażenie następuje drogą płciową, podczas stosowania tego samego ręcznika co osoba zakażona, korzystania z tej samej toalety (np. toalety publicznej), sauny, podczas kąpieli w tej samej wodzie. Z powodu wielu źródeł zakażenia rzesistkowica może zaatakować również dzieci w momencie zaniedbania higieny osobistej. Osoba zarażona w przeciwieństwie do nosiciela wykazuje szereg swoistych objawów ze strony układu płciowo-moczowego.

Rzesistkowica w swoim przebiegu może mieć charakter ostry i przewlekły.

Stany przewlekłe u kobiet powodują mikroskopowe zmiany w komórkach nabłonka szyjki macicy, a u mężczyzn przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego.

Występowania rzesistkowicy zwiększa ryzyko występowania innych chorób wenerycznych:

chlamydiozy, kiły, rzeżączki.

Badaniu powinny się poddać nie tylko osoby z symptomami choroby, ale przede wszystkim kobiety w ciąży i przed porodem, u których rzeżączkowica może spowodować przedwczesny poród, niską wagę urodzeniową dziecka oraz zakażenie dziecka podczas porodu.

## Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot odpowiedzialny:

FARMABOL Sp. z o.o.  
ul. T. Ociepki 4  
34-600 Limanowa

## Galeria

